

GIUSEPPE PLATIA^(*) & RAINER SCHIMMEL^(**)

DESCRIZIONE DI NUOVI *PRIOPUS* CASTELNAU CON NOTE GEONEMICHE E SINONIMICHE

(COLEOPTERA, ELATERIDAE, MELANOTINAE)

Fra il 1995 e il 1996 abbiamo pubblicato quattro contributi alla conoscenza delle specie di *Priopus* Castelnau della regione indomalese. Oggi rendiamo noti i risultati ottenuti dall'esame dell'abbondante materiale che abbiamo continuato a ricevere in studio in questi ultimi anni, grazie al quale aumenta di 20 unità il numero di entità incluse nel genere; per 16 specie si definisce meglio la geonemia e per 2 viene descritto il maschio che non era finora noto.

Per la prima volta sono segnalate 2 specie (nuove) di *Priopus* per l'isola di Mindoro nell'Arcipelago delle Filippine e vengono infine poste in sinonimia due specie descritte dell'India dagli autori indiani PUNAM & VASU (1996) ancora sotto il vecchio nome generico di *Neodiploconus* Hyslop.

I musei, le istituzioni pubbliche o le collezioni private dove il materiale viene conservato sono indicati con i seguenti acronimi elencati in ordine alfabetico:

CCW	= coll. Cate, Vienna
CHKM	= coll. Mertlik, Hradec Kralove
CHP	= coll. Horak, Praga
CPG	= coll. Platia, Gatteo
CRG	= coll. Riese, Genova
CSB	= coll. Sausa, Bratislava
CSV	= coll. Schimmel, Vinningen
IRSNB	= Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles

(*) Via Molino Vecchio, 21, 47030 Gatteo (Forlì); e-mail: pinoplatia@libero.it

(**) Wiesenstrasse 6, D-66957 Vinningen (Germany).
e-mail: rainer.schimmel@web.de

- MMB = coll. Jagemann, Moravske Museum, Brno
MSNG = Museo Civico di Storia Naturale «G. Doria», Genova
TM = Termesztudomány Museum, Budapest

Ricordiamo che per le misure del corpo la lunghezza è considerata dal margine anteriore della fronte all'apice elitrale e la larghezza viene misurata nella parte più ampia, mentre per il pronoto la lunghezza viene misurata nella parte mediana dalla base all'apice e la larghezza comprende se del caso anche l'apice degli angoli posteriori.

SPECIE NUOVE DI INDIA, NEPAL, BHUTAN E BANGLADESH

Priopus bispinosus n. sp.

Diagnosi. La specie differisce da tutte quelle note per le due corte spine presenti nel lato ventrale del margine anteriore della fronte.

Materiale esaminato. Holotypus ♀: India: Meghalaya, 9 km NW of Jowai, m 1400, 12.V.1999, leg. Dembicky & Pacholatko (CCW).

Descrizione della femmina. Interamente castano scura con sfumature ferruginee; antenne e zampe ferruginosi; superficie rivestita di densa pubescenza fulva.

Fronte piana con margine anteriore ispessito, al centro brevemente subrettilineo, sporgente sul clipeo e munito di due corte spine laterali, verticali e dirette ventralmente; punti fortemente ombelicati e contigui. Antenne quasi raggiungenti l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II articolo cilindrico, III subcilindrico poco più lungo del II, presi assieme della lunghezza del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi; XI ellissoidale.

Pronoto poco più largo che lungo, fortemente convesso con depressione mediana longitudinale profonda nella declività basale, molto superficiale in avanti e prolungata fino alla metà del disco; lati subparalleli, fortemente ristretti nel terzo anteriore, sinuati presso gli angoli posteriori, questi lunghi, acuminati e divergenti all'apice, bica-renati, la carena esterna è più forte e poco più lunga di quella interna, questa è meno evidente e diretta internamente; punti sul disco profondi, ombelicati, con brevissimi intervalli lucidi, ai lati più densi, fortemente ombelicati, perfino contigui.

Scutello subrettangolare, leggermente convesso, punteggiato, alla base ribordato. Elitre 3 volte più lunghe del pronoto e 2,7 volte più lunghe che larghe; lati subparalleli fin oltre la metà e poi ristretti; strie fortemente incise e punteggiate; interstrie subconvesse con punti molto più fini; apice regolarmente arrotondato.

Apofisi prosternale inclinata bruscamente dietro le anche e leggermente incavata apicalmente.

Maschio ignoto.

Dimensioni. Lungh. mm 12; largh. mm 3.

SPECIE NUOVE DI BIRMANIA, TAILANDIA, LAOS, CAMBOGIA,
VIETNAM E CINA

Priopus beauchenei n. sp.

(Figg. 1, 18).

Diagnosi. Specie molto simile a *rufulus* (Candèze) ma con il corpo più snello, le antenne più lunghe e gli angoli posteriori del pronoto più acuti e divergenti.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: S Vietnam: 12 km N of Dalat, Lang Bian, m 1580-1750, 17/21.IV.1995, leg. Pacholatko & Dembicky (CCW); 6 Paratypi ♂♂: stessi dati (CCW, CPG, CSV).

Descrizione del maschio. Interamente ferruginoso con sfumature giallastre esclusi il capo nerastro e così i lati del corpo, le antenne e le zampe che possono essere pure nerastri; rivestito di pubescenza giallo-fulva.

Fronte convessa fino al margine anteriore, questo fortemente arcuato, leggermente ispessito e proiettato sopra il clipeo, che è fornito di due deboli carene; punti ombelicati, con brevissimi intervalli lucidi.

Antenne raggiungenti o superanti appena l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II lungo quanto largo, III subconico, poco più lungo del II, presi assieme della lunghezza del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi, con leggera carena; XI ellissoidale.

Pronoto 1,2 volte più largo che lungo, regolarmente convesso, con lieve depressione mediana longitudinale nella declività basale; lati

arcuati, da dietro la metà in avanti leggermente ristretti, in addietro sinuati presso gli angoli posteriori, questi lunghi, acuti, fortemente divergenti, bicarenati; le carene sono egualmente sviluppate e dirette parallelamente verso l'interno; ribordo laterale completo; punti sul disco molto sparsi, semplici o leggermente ombelicati, con intervalli pari o di molto superiori al loro diametro; anche ai lati i punti sono fini e sparsi.

Scutello subrettangolare, leggermente convesso. Elitre 3,2 volte più lunghe del pronoto e 2,8 volte più lunghe che larghe; lati subparalleli, apice integro; strie ben incise e punteggiate, interstrie piane, più finemente punteggiate.

Apofisi prosternale all'apice integra.

Edeago come in fig. 1.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 13-14,5; largh. mm 3,3-3,5.

Priopus decoratus n. sp.

Diagnosi. Specie simile per la colorazione e la forma dell'apofisi prosternale a *brevis* (Candèze) dal quale si distingue essenzialmente per il corpo più piccolo e stretto, la colorazione chiara del pronoto più pallida e le antenne più lunghe.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Tailandia: Mae Hong Son, Soppong, m 1500, 7/12.V.1996, leg. S. Becvar (CRG don. MSNG).

Descrizione del maschio. Bicolore; capo, antenne, stretto orlo anteriore ed apice degli angoli posteriori del pronoto neri; pronoto giallo arancio con grande macchia nerastra subovale, centrale, raggiungente la base in addietro e l'orlo anteriore; scutello, elitre e zampe castano scuri; prosterno e apofisi neri; propleure e addome giallo arancio, la parte rimanente del colore elitrale; rivestito di ruvida pubescenza nerastra in parte eretta.

Fronte piana con margine anteriore leggermente ispessito, subarcuato e sporgente sul clipeo; punti fortemente ombelicati con brevissimi intervalli, fino a contigui. Antenne superanti con due articoli l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II articolo cilindrico, lungo quanto largo, III subconico, poco più lungo del II, presi assieme della lunghezza del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi; XI ellissoidale.

Pronoto appena più largo che lungo, fortemente convesso con accenno di depressione mediana longitudinale al centro del disco; lati arcuati, dalla metà in avanti ristretti, in addietro sinuati presso gli angoli posteriori, questi acuti, fortemente divergenti, bicarenati; carene di eguale sviluppo, molto vicine, decorrenti parallelamente verso l'interno; ribordo laterale completo; punti sul disco leggermente ombelicati, molto sparsi, poco evidenti, con intervalli molto superiori al loro diametro ed ai lati ancora più sparsi.

Scutello subrettangolare, piano, fortemente ribordato alla base. Elitre 3 volte più lunghe del pronoto e 2,5 volte più lunghe che larghe; lati subparalleli fino alla metà poi leggermente allargati ed infine ristretti fino all'apice, questo semplice e regolarmente arrotondato; strie alla base poco distinte e lisce, poi più evidenti e punteggiate; interstrie alla base subconvesse, in addietro piane e sparsamente punteggiate.

Apofisi prosternale orizzontale dietro le anche e biforcata all'apice.

Edeago con lobo mediano molto più lungo dei parameri.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 7; largh. mm 1,87.

Priopus dissimilis n. sp.

(Figg. 2, 19)

Diagnosi. Specie vicina ad *angulatus* (Candèze) ma facilmente distinta per le antenne più lunghe superanti con due articoli l'apice degli angoli posteriori del pronoto.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: S Vietnam: 40 km NW of An Khe, Buon Luoi, m 650-750, 28.III-12.IV.1995, leg. Pacholátko & Dembicky (CCW).

Descrizione del maschio. Interamente castano scuro, poco lucido, con sfumature ferruginee; rivestito di ruvida pubescenza giallo-fulva.

Fronte piana con margine anteriore leggermente ispessito, al centro subrettilineo, diretto in basso e di poco sporgente sul clipeo; punti ombelicati e contigui.

Antenne superanti con circa 2 articoli l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II articolo lungo quanto largo, III subconico, poco

più lungo del II, presi assieme più corti del IV; IV-X triangolari, molto più lunghi che larghi; XI a lati subparalleli, molto stretto e più lungo del penultimo.

Pronoto 1,25 volte più largo che lungo, moderatamente ma regolarmente convesso con accenno di solco nella declività basale; lati appena arcuati, quasi paralleli, solo agli angoli posteriori sinuati, questi divergenti, lunghi, acuti, bicarenati; la carena esterna è molto più lunga e prominente, vicinissima al ribordo laterale e diretta in avanti, quella interna è molto più corta, poco visibile, ma allo stesso livello o leggermente più alta; punti superficiali, ombelicati, con intervalli brevissimi e poco lucidi, ai lati molto più superficiali e fortemente ombelicati.

Scutello subrettangolare, piano, punteggiato. Elitre 3,2 volte più lunghe del pronoto e 2,5 volte più lunghe che larghe; lati paralleli fin oltre la metà poi debolmente ristretti fino all'apice, questo integro; strie regolarmente incise e punteggiate; interstrie piane, ruvidamente punteggiate.

Apofisi prosternale appena incisa all'apice.

Edeago come in fig. 2.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 12,5; largh. mm 3,2.

Priopus kirschii n. sp.

(Fig. 3)

Diagnosi. Specie vicina a *quatei* Platia & Schimmel per la fronte impressa prima del margine ma distinta essenzialmente per il colore scuro e le antenne più lunghe superanti l'apice degli angoli posteriori del pronoto.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Laos: Phu Bosi Dac, 11.V.1994, leg. S. Steinke (CCW).

Descrizione del maschio. Interamente nerastro lucido con accenno di colore ferrugineo lungo la sutura elitrale; antenne e zampe ferruginei; rivestito di ruvida pubescenza fulva.

Fronte piana sul vertice, leggermente impressa nella metà anteriore prima del margine, questo arcuato, leggermente ispessito e sporgente sul clipeo; punti superficiali, fortemente ombelicati, con brevissimi spazi lucidi.

Antenne superanti con 2 articoli l'apice degli angoli posteriori del pronoto, II e III articolo subcilindrici, subeguali, presi assieme della lunghezza del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi, senza accenno di carena.

Pronoto appena più largo che lungo, moderatamente ma regolarmente convesso, senza accenno di solco mediano longitudinale nella declività basale; lati leggermente e regolarmente arcuati, sinuati presso gli angoli posteriori, questi lunghi, acuti, divergenti, bicarenati, carene fini, poco evidenti, allo stesso livello, dirette verso l'interno; margine laterale per oltre i due terzi della lunghezza visibile dall'alto; punti profondi, semplici o leggermente ombelicati con intervalli sul disco pari al loro diametro o più ampi, lucidi, ai lati superficiali e fortemente ombelicati.

Scutello piano, punteggiato. Elitre 3 volte più lunghe del pronoto e 2,3 volte più lunghe che larghe; lati per oltre i due terzi della lunghezza subparalleli poi leggermente ristretti fino all'apice; strie normalmente incise e punteggiate fino all'apice, questo integro; interstrie piane con superficie ruvida.

Apofisi prosternale all'apice integra.

Edeago come in fig. 3.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 8,7; largh. mm 2,5.

***Priopus laoticus* n. sp.**

(Fig. 4)

Diagnosi. Simile a *steinkeae* n. sp. ma con il pronoto più allungato, meno arcuato ai lati e con le carene degli angoli posteriori allo stesso livello.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: C Laos: Bolikhamsai prov., Ban Nape, Koew Nua Pass, 18.IV.1V.1998, leg. E. Jendek & O. Sausa (CSB); 2 Paratypi (♂ & ♀): stessi dati (CPG, CSB).

Descrizione del maschio. Interamente ferrugineo con sfumature nerastre; rivestito di ruvida pubescenza giallo-fulva.

Fronte piana con margine anteriore subarcuato, ispessito e proiettato sul clipeo; punti robusti, ombelicati, contigui o con brevissimi intervalli lucidi.

Antenne non raggiungenti per circa un segmento l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II articolo cilindrico, appena più lungo che largo, III subconico, più lungo del II, presi assieme chiaramente più lunghi del IV; IV-X triangolari, poco più lunghi che larghi; XI ellissoidale.

Pronoto appena più largo che lungo, convesso, con leggero solco mediano solo nella declività basale; lati subparalleli fin quasi agli angoli posteriori, questi sono lunghi, acuti, fortemente divergenti, bicarenati; la carena esterna è più robusta e più lunga, quella interna è più fine e corta ma ben evidente, allo stesso livello o leggermente più elevata; punti profondi, semplici, sul disco con intervalli in media pari al loro diametro o più ampi, ai lati più densi.

Scutello lungo e stretto, leggermente convesso. Elitre 3 volte più lunghe del pronoto e 2,7 volte più lunghe che larghe; lati subparalleli per oltre i due terzi della lunghezza, ristretti poi fino all'apice, questo integro; strie regolarmente incise e punteggiate; interstrie da piane a subconvesse, sparsamente punteggiate.

Apofisi prosternale leggermente incisa all'apice.

Edeago come in fig. 4.

Dimensioni. Lungh. mm 13,4-14,3; largh. mm 3,3-3,6.

***Priopus steinkeae* n. sp.**

(Figg. 5, 17)


Diagnosi. Specie vicina a *laoticus* n. sp. ma distinto per il pronoto più allargato e per la carena interna degli angoli posteriori debole e posta ad un livello più basso di quella esterna.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Burma: Tenasserim, 30.V.1994, leg. S. Steinke (CCW); 1 Paratypus ♀: stessi dati (CPG).

Descrizione del maschio. Interamente ferrugineo con sfumature più scure ai margini del corpo; rivestito di ruvida pubescenza giallo-fulva.

Fronte convessa con margine anteriore arcuato, ispessito e fortemente sporgente sul clipeo, questo con due flebili carene ai lati; punti robusti, superficiali, ombelicati, con brevissimi intervalli lucidi.

Antenne non raggiungenti per circa un segmento l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II lungo quanto largo, III subconico,



Figg. 1-6 - Eedeago in visione dorsale. *Priopus beauchenei* n. sp. (1); *P. dissimilis* n. sp. (2); *P. kirschi* n. sp. (3); *P. laoticus* n. sp. (4); *P. steinkeae* n. sp. (5); *P. brevicollis* (Fleutiaux) (6).

appena più lungo del II, presi assieme della lunghezza del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi, con accenno di carena mediana; XI ellissoidale.

Pronoto 1,2 volte più largo che lungo, convesso, con leggero ma chiaro solco mediano longitudinale dalla declività basale fin oltre la metà; lati arcuati, dalla metà in avanti ristretti, in addietro prima subparalleli poi sinuati presso gli angoli, questi acuti, lunghi, divergenti e bicarenati; la carena esterna è molto più evidente e diretta in avanti, quella interna è più fine, poco evidente e posta ad un livello più basso; punti sul disco profondi, semplici o leggermente ombelicati, con intervalli in media di molto inferiori al loro diametro, ai lati più robusti ed ombelicati ma spaziati.

Scutello allungato, convesso. Elitre 3 volte più lunghe del pronoto e 2,7 volte più lunghe che larghe; lati regolarmente e gradualmente ristretti dalla base all'apice, questo integro; strie regolarmente punteggiate, interstrie piane con punti sparsi.

Apofisi prosternale leggermente incisa all'apice.

Edeago come in fig. 5.

Femmina. Molto simile al maschio, con antenne poco più corte e II e III articoli presi assieme poco più lunghi del IV.

Dimensioni. Lungh. mm 13,5-14,3; largh. mm 3,4-3,7.

SPECIE NUOVE DI INDONESIA E MALAYSIA

Priopus b a u m i n. sp.

(Fig. 7)

Diagnosi. Specie simile ad *exquisitus* (Candèze) ma più piccola, con colorazione uniforme e antenne più lunghe con articoli leggermente carenati ad iniziare dal quarto.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Singapore, 1929, leg. Dr Baum (CCW); 6 Paratypi ♂♂ con gli stessi dati dell'holotypus ed inoltre: Malaysia: Pahang, Johor, Endau Rampin Nat. Park, Salendang, 28.II-12.III.1995, leg. M. Strba & R. Hergovits; Johor, 15 km NW of Kota Tinggi, Munta Hak Mt., m 200, 14/16.V.2001, leg. P. Cechovsky (CCW; CPG; CRG; CSB).

Descrizione del maschio. Da castano ferrugineo a nerastro con antenne e zampe ferruginei; pubescenza ruvida, giallo-fulva.

Fronte piana con margine anteriore arcuato, leggermente ispessito, diretto in basso od appena sporgente sul clipeo; punti ombelicati, contigui.

Antenne superanti con 1-1,5 articoli l'apice degli angoli posteriori del pronoto; articoli II e III subcilindrici, subeguali, presi assieme della lunghezza del IV; IV-X triangolari con leggera carena longitudinale, più lunghi che larghi; XI ellissoidale.

Pronoto appena più largo che lungo, convesso, con leggero solco mediano longitudinale dalla declività basale, dove è più marcato, fin oltre la metà dove invece è poco evidente; lati dalla base all'apice quasi regolarmente ristretti, angoli posteriori molto acuti, lunghi, non divergenti, bicarenati, la carena esterna è ben evidente, più alta e diretta verso l'interno, quella interna è finissima e posta ad un livello inferiore; punti sul disco profondi, semplici o leggermente ombelicati con intervalli inferiori al loro diametro, verso i lati più densi, fortemente ombelicati, pressoché contigui.

Scutello allungato, convesso, punteggiato. Elitre 2,7 volte più lunghe del pronoto e 2,6 volte più lunghe che larghe; lati dalla base all'apice leggermente ma regolarmente ristretti, apice integro; strie incise e punteggiate; interstrie piane con superficie ruvida.

Apofisi prosternale integra all'apice.

Edeago come in fig. 7.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 6-7,5; largh. mm 1,75-2,1.

Priopus everetti n. sp.

(Fig. 8)

Diagnosi. Simile ad *ineptus* (Candèze) ma con il corpo più robusto e con l'apice degli angoli posteriori del pronoto più breve.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Indonesia: Sulawesi, Bonthain, IX.1895, leg. A. Everett (CPG).

Descrizione del maschio. Interamente castano ferrugineo con antenne e zampe più chiari; rivestito di ruvida pubescenza giallastra.

Fronte leggermente impressa nella metà anteriore con margine ispessito, regolarmente arcuato, diretto in basso e di poco sporgente sul clipeo; punti robusti, ombelicati, pressoché contigui.

Antenne superanti con circa 2 articoli l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II articolo cilindrico, III subconico, di lunghezza subeguale, presi assieme della lunghezza del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi, debolmente carenati; XI ellissoidale più lungo del penultimo.

Pronoto appena più largo che lungo, moderatamente convesso, nella declività basale con accenno di solco, sul disco lievemente depresso al centro; lati appena ma regolarmente arcuati, angoli posteriori corti, troncati, prima divergenti poi convergenti all'estremo apice, bicarenati; le carene sono poco evidenti, subparallele, quella esterna è più prominente e robusta di quella interna; ribordo laterale visibile solo nel terzo posteriore; punti profondi, semplici o leggermente ombelicati, con brevissimi intervalli lucidi, ai lati fortemente ombelicati.

Scutello leggermente convesso, poco più lungo che largo, punteggiato. Elitre 3 volte più lunghe del pronoto e 2,5 volte più lunghe che larghe; lati subparalleli per oltre i due terzi della lunghezza e poi ristretti fino all'apice, questo integro; strie normalmente incise e punteggiate, interstrie ruvide.

Articolo IV dei tarsi molto più piccolo del precedente.

Edeago come in fig. 8.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 8; largh. mm 2,2.

Priopus horaki n. sp.

(Figg. 10, 20)

Diagnosi. Specie vicina a *candzei* Platia & Schimmel per aspetto e dimensioni, se ne distingue per la carena interna degli angoli posteriori del pronoto molto più fine e ad un livello più basso di quella esterna.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Malaysia: Sarawak, Kuching distr., Mt Serapi, 27/29.III.1994, leg. J. Horak (CPG).

Descrizione del maschio. Interamente ferrugineo con sfumature nerastre ai bordi del corpo ed ai lati verso l'apice elitale; rivestito di rada pubescenza giallo-fulva.

Fronte convessa con ampio margine anteriore regolarmente e fortemente arcuato, ispessito e proiettato sul clipeo, questo con due flebili

carene ai lati; punti profondi, semplici o leggermente ombelicati con brevissimi intervalli lucidi.

Antenne corte non raggiungenti per circa due articoli l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II e III subcilindrici, subeguali, presi assieme poco più lunghi del IV; IV-X triangolari, poco più lunghi che larghi con debole carena mediana longitudinale; XI ellissoidale, della lunghezza del penultimo.

Pronoto poco più largo che lungo, convesso, con debole impressione, come una linea mediana longitudinale per tutta la lunghezza, più profonda nella declività basale; lati arcuati, da dietro la metà in avanti regolarmente ristretti, sinuati presso gli angoli posteriori, questi acuti, prima leggermente divergenti, ma all'estremità apicale convergenti, bicarenati; le carene sono parallele, quella esterna è più lunga, quella interna è più debole ma allo stesso livello; punti profondi, semplici, sul disco ben spaziati, da un diametro a molto di più, ai lati più robusti ma sempre ben spaziati.

Scutello leggermente convesso, punteggiato. Elitre 2,7 volte più lunghe del pronoto e 2,5 volte più lunghe che larghe; lati notevolmente e regolarmente ristretti dalla base all'apice, questo incavato con spina esterna più lunga e acuta di quella interna; strie regolarmente incise e punteggiate; interstrie piane, densamente punteggiate.

Apofisi prosternale leggermente incisa all'apice.

Edeago come in fig. 10.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 11,5; largh. mm 3.

Priopus humeralis n. sp.

(Fig. 9)

Diagnosi. Specie simile a *basalis* (Schwarz) ma più piccola e solo con gli omeri elitrali gialli, le prime due interstrie e la sutura elitrale neri.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Indonesia: W Sumatra, VIII.1991 (CHKM); 2 Paratypi (♂ & ♀): stessi dati (CPG).

Descrizione del maschio. Bicolore; capo, pronoto, base delle elitre dalla III interstria e compresi gli omeri, zampe, parte infe-

riore eccetto l'addome, di colore rosso-arancio, parti rimanenti nerastra; rivestito di ruvida pubescenza nerastra.

Fronte convessa con margine anteriore arcuato, ispessito e proiettato sul clipeo, questo con due flebili carene al centro; punti robusti, ombelicati, con brevissimi intervalli.

Antenne corte, superanti di poco la metà del pronoto; articoli II e III subcilindrici, subeguali, presi assieme più lunghi del IV; IV-X triangolari, poco più lunghi che larghi, con leggera carena; XI ellissoidale.

Pronoto lungo quanto largo, convesso, con leggero solco mediano longitudinale dalla base fin oltre la metà; lati da dietro la metà in avanti fortemente ristretti, sinuati presso gli angoli posteriori, questi lunghi, acuti, leggermente divergenti, bicarenati; le carene, parallele e dirette all'interno, sono allo stesso livello, quella interna appena più debole; punti molto fini, sparsi, profondi, semplici, con intervalli superiori al loro diametro anche fino a due o tre volte.

Scutello appena più lungo che largo, convesso, punteggiato. Elitre 2,7 volte più lunghe del pronoto e 2,5 volte più lunghe che larghe; lati ristretti dalla base all'apice, questo incavato; strie normalmente incise dalla base all'apice, interstrie piane con punti più fini.

Apofisi prosternale leggermente incisa all'apice.

Edeago come in fig. 9.

Femmina. Molto simile al maschio, con antenne appena più corte ed articoli dal IV più tozzi.

Dimensioni. Lungh. mm 8,2-8,7; largh. mm 2,2-2,3.

Priopus jucundus n. sp.

Diagnosi. Specie appartenente al primo gruppo per gli angoli posteriori del pronoto unicarenati; per la colorazione è estremamente simile a *seminiger* (Candèze) dal quale si distingue essenzialmente per le dimensioni minori ed il capo nero come le elitre.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Malaysia : Selangor Templer Park, lowland rainforest, 5.IV.1995, leg. O. Merkl (TM).

Descrizione del maschio. Bicolore; capo, antenne, elitre, nerastri; pronoto e parte inferiore giallo-arancio; zampe ferruginose;

rivestito di lunga e poco densa pubescenza nerastra, in gran parte semieretta.

Fronte convessa con margine anteriore subarcuato, leggermente ispessito, diretto in basso e nettamente sporgente sul clipeo; punti forti, ombelicati, irregolarmente distribuiti, con intervalli nettamente inferiori al loro diametro. Antenne raggiungenti l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II articolo cilindrico, III subconico, poco più lungo del II, presi assieme più lunghi del IV; IV-X triangolari, lunghi quanto larghi; XI ellissoidale.

Pronoto 1,2 volte più largo che lungo, fortemente convesso sul disco, con accenno di solco mediano longitudinale nella declività basale; lati quasi regolarmente e fortemente ristretti dalla base all'apice; angoli posteriori acuti, nettamente unicarenati, con carena diretta internamente; ribordo laterale subrettilineo e completo; punti profondi, semplici o vagamente ombelicati, sparsi, con intervalli in media superiori a due o tre volte il loro diametro.

Scutello subrettangolare, leggermente convesso, fortemente ribordato alla base. Elitre 2,8 volte più lunghe del pronoto e 2,3 volte più lunghe che larghe; lati subparalleli fin verso la metà poi ristretti verso l'apice, questo arrotondato; strie normalmente incise e punteggiate; interstrie piane con superficie leggermente ruvida.

Apofisi prosternale leggermente piegata dietro le anche anteriori e incisa all'apice.

Edeago con parameri fortemente sinuati ai lati e lobo mediano molto più lungo dei parameri.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 7,5; largh. mm 2,18.

***Priopus pahangensis* n. sp.**

Diagnosi. Per la forma generale si avvicina ad *exquisitus* (Candèze) dal quale si separa essenzialmente per le antenne più corte non raggiungenti l'apice degli angoli posteriori del pronoto e la forma dell'edeago.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Malaysia: Pahang, Benom Mts, 15 km E Kampong Dong, m 300-1000, 24.III-15.IV.1998, leg. Dembicky & Pacholatko (CCW); 1 Paratypus ♂: stessi dati (CPG).

Descrizione del maschio. Interamente nerastro poco lucido ad eccezione di antenne e zampe ferruginei; rivestito di densa pubescenza fulva.

Fronte convessa con margine anteriore leggermente ispessito, regolarmente arcuato e sporgente sul clipeo; punti superficiali, fortemente ombelicati con brevissimi spazi lucidi. Antenne non raggiungenti per circa un articolo l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II articolo cilindrico, lungo quanto largo, III subconico poco più lungo del II, presi assieme della lunghezza del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi; XI ellissoidale.

Pronoto lungo quanto largo, moderatamente convesso con stretto ma profondo solco mediano longitudinale, dalla declività basale prolungato molto più superficialmente nel terzo posteriore; lati dalla base all'apice quasi regolarmente ristretti; angoli posteriori lunghi, acuti, all'apice appena divergenti, bicarenati; la carena esterna è più prominente e poco più lunga di quella interna, questa è molto meno evidente, ambedue sono dirette internamente; ribordo laterale completo; punti profondi, sul disco leggermente ombelicati con brevissimi intervalli, verso i lati sempre più densi e fortemente ombelicati, ai margini contigui.

Scutello subrettangolare, leggermente convesso, alla base ribordato. Elitre 2,8 volte più lunghe del pronoto e 2,4 volte più lunghe che larghe; lati dalla base all'apice quasi regolarmente ristretti; apice regolarmente arrotondato; strie fortemente incise e punteggiate; interstrie ruvide.

Apofisi prosternale piegata immediatamente dietro le anche, con apice integro.


Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 7,8-8; largh. mm 2,1-2,2.

Priopus seramensis n. sp.

Diagnosi. Specie prossima a *bicolor* Platia & Schimmel delle Filippine per la colorazione e l'aspetto generale, ma distinta per l'apice elitrale nettamente incavato.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Indonesia: Is. Seram, Maluku, Solea, 12 km SE Wahai, 31.X-4.XI.1998, leg. J. Horak (CHP);



Figg. 7-14 - Edeago in visione dorsale. *Priopus baumi* n. sp. (7); *P. everetti* n. sp. (8); *P. humeralis* n. sp. (9); *P. horaki* n. sp. (10); *P. sumatrensis* n. sp. (11); *P. bryanti* Platia & Schimmel (12); *P. politoides* n. sp. (13); *P. mindoroensis* n. sp. (14).

9 Paratypi (4 ♂♂ e 5 ♀♀): stessi dati dell'Holotypus e stessa località, ma 16.X-4.XII.1999, leg. S. Bily (CHP; CCW, CPG; CSV; MSNG).

Descrizione del maschio. Bicolore; capo, margini dello scutello ed elitre neri; pronoto, propleure, parte centrale dello scutello rosso-arancio: prosterno, apofisi prosternale e parte rimanente nerastri; antenne e zampe ferruginei; rivestito di fine pubescenza giallo-fulva.

Fronte convessa col margine anteriore regolarmente arcuato, lievemente ispessito ed appena sporgente sul clipeo; punti forti, ombelicati, con brevissimi intervalli lucidi. Antenne raggiungenti l'apice degli angoli posteriori del pronoto; articoli II e III subcilindrici, subeguali, presi assieme della lunghezza del quarto; IV-X triangolari, più lunghi che larghi, con leggera carena mediana longitudinale; XI ellissoidale.

Pronoto appena più largo che lungo, moderatamente ma regolarmente convesso con leggera depressione mediana longitudinale dalla declività basale fino al centro del disco; lati dalla metà in addietro subparalleli, in avanti moderatamente ristretti; angoli posteriori acuminati, non od appena divergenti all'apice, bicarenati; le carene hanno eguale sviluppo e disegnano una stretta V in avanti; punti sul disco profondi e semplici con intervalli variabili e pari in media al loro diametro o più ampi, ai lati più densi ma non contigui e qualcuno ombelicato.

Scutello quadrangolare, leggermente convesso al centro e alla base ribordato. Elitre 2,6 volte più lunghe del pronoto e 2,4 volte più lunghe che larghe; lati dalla base all'apice quasi regolarmente ristretti; apice incavato con corte punte ai lati interni ed esterni; strie ben incise e punteggiate; interstrie piane ma con punti più fini.

Apofisi prosternale leggermente incavata all'apice.

Femmina. Forma più convessa, elitre più parallele, antenne più corte non raggiungenti l'apice degli angoli posteriori del pronoto, con gli articoli II e III presi assieme della lunghezza del IV, questo ed i seguenti menù seghettati.

Dimensioni. Lungh. mm 9,4-10,7; largh. mm 2,6-2,9.

***Priopus sumatrensis* n. sp.**

(Fig. 11)

Diagnosi. Specie vicina a *flavidus* Platia & Schimmel ma distinta per il corpo più piccolo, la colorazione più scura e le antenne

più corte non raggiungenti per circa un articolo l'apice degli angoli posteriori del pronoto.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Indonesia: N Sumatra, Huta Padang, ca 62 km SE Pemangtan Siantar, m 250, 10.IX.1996, leg. E. W. Diehl (CCW).

Descrizione del maschio. Interamente ferruginoso con sfumature nerastre ai bordi del pronoto e delle elitre; rivestito di densa pubescenza fulva.

Fronte piana con margine anteriore ispessito, subrettilineo, proiettato suborizzontalmente sul clipeo, questo leggermente carenato longitudinalmente ai lati; punti profondi ombelicati, con intervalli variabili in media inferiori al loro diametro. Antenne non raggiungenti per circa un segmento l'apice degli angoli posteriori del pronoto; II articolo cilindrico, lungo quanto largo, III subconico poco più lungo del II, presi assieme più lunghi del IV; IV-X triangolari, appena più lunghi che larghi; XI ellissoidale.

Pronoto poco più largo che lungo, regolarmente convesso con stretta linea mediana longitudinale profonda nella declività basale, molto superficiale e raggiungente quasi il bordo anteriore sul disco; lati arcuati, da dietro la metà in avanti regolarmente ristretti, in addietro sinuati prima degli angoli posteriori, questi lunghi, divergenti all'apice, bicarenati, le carene sono della stessa lunghezza, egualmente prominenti e formano in avanti una stretta V diretta verso l'interno; ribordo laterale completo; punti sul disco profondi, semplici o debolmente ombelicati con intervalli in media superiori al loro diametro, ai lati solo poco più forti e più densi ma sempre con intervalli non inferiori al loro diametro.

Scutello rettangolare, leggermente convesso, alla base ribordato. Elitre 2,6 volte più lunghe del pronoto e 2,3 volte più lunghe che larghe; lati dalla base all'apice regolarmente ristretti; apice regolarmente arrotondato; strie ben incise e punteggiate; interstrie leggermente convesse con punteggiatura molto fine.

Apofisi prosternale regolarmente inclinata dietro le anche anteriori con apice integro.

Edeago come in fig. 11.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 8; largh. mm 2,4.

SPECIE NUOVE DELLE FILIPPINE

Priopus fasciatus n. sp.

(Fig. 15)

Diagnosi. Molto simile a *samuelsoni* Platia & Schimmel ma distinto essenzialmente per il capo nero e la punteggiatura del pronoto più marcata.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Filippine: N Luzon, Kalinga-Apjabra Prov., Cordillera Centr. around Pass, m 1500-1700, 26/28.III.2000, leg. L. Dembicky (CCW).

Descrizione del maschio. Lucido; capo, stretto orlo anteriore del pronoto, lati delle elitre dal VII intervallo ed estremo apice neri; parte rimanente con zampe e parte inferiore giallo-ferruginoso; rivestito di pubescenza fulva.

Fronte leggermente convessa con margine anteriore lievemente ispessito, regolarmente arcuato ed appena sporgente sul clipeo; punti profondi, ombelicati, con intervalli in media pari alla metà del loro diametro. Antenne superanti con quasi un segmento l'apice degli angoli posteriori del pronoto; articoli II e III subcilindrici, col III poco più lungo del II; presi assieme poco più corti del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi con lieve carena longitudinale; XI ellissoidale.

Pronoto poco più largo che lungo, piuttosto depresso, gradualmente declive ai lati ed alla base, con accenno di depressione mediana longitudinale; lati debolmente arcuati, dalla metà in avanti gradualmente ristretti, in addietro lungamente sinuati fino agli angoli posteriori, questi acuminati, divergenti, bicarenati, la carena interna è più prominente rispetto a quella esterna più fine, poco evidente e molto prossima al margine laterale, questo completo; punteggiatura costituita sul disco da punti semplici o leggermente ombelicati con intervalli variabili, in media superiori al loro diametro.

Scutello subrettangolare, leggermente convesso, sparsamente punteggiato. Elitre 3,38 volte più lunghe del pronoto e 3 volte più lunghe che larghe; lati paralleli fino alla metà poi ristretti fino all'apice, che è incavato; strie regolarmente punteggiate; interstrie piane con punteggiatura sparsa.

Ultimo segmento addominale regolarmente arrotondato.

Apofisi prosternale orizzontale dietro le anche, incavata all'apice.

Edeago come in fig. 15.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 12,8; largh. mm 2,85.

***Priopus mindoroensis* n. sp.**

(Fig. 14)

Diagnosi. Specie simile a *torrevillasi* Platia & Schimmel ma più piccola, con colorazione chiara e secondo e terzo articoli delle antenne presi assieme più lunghi del quarto.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Filippine: Mindoro Occ., Amnay river valley, 25 km SE Santa Cruz, 17.IV.2000, leg. L. Dembicky (CCW); 2 Paratypi ♂♂: stessi dati (CCW; CPG).

Descrizione del maschio. Interamente giallo ferruginoso con ruvida e lunga pubescenza giallo fulva, semieretta sulle elitre.

Fronte convessa con margine anteriore leggermente ispessito, regolarmente arcuato ed appena sporgente sul clipeo; punti superficiali, ombelicati, con brevissimi intervalli lucidi. Antenne raggiungenti e superanti appena l'apice degli angoli posteriori del pronoto; articoli II e III subcilindrici e subeguali, presi assieme più lunghi del IV; IV-X triangolari, poco più lunghi che larghi, longitudinalmente lievemente carenati; XI ellissoidale.

Pronoto lungo quanto largo, moderatamente ma regolarmente convesso con corta e stretta depressione mediana longitudinale nella declività basale; lati quasi regolarmente ristretti dalla base all'apice; angoli posteriori acuti, non od appena divergenti, bicarenati; carene della stessa lunghezza e sviluppo, dirette internamente, formanti in avanti una lunga e stretta formanti V; ribordo laterale completo. Punti sul disco profondi, semplici o vagamente ombelicati con intervalli variabili ma in media superiori al loro diametro, più grandi e più densi ai lati ma sempre con brevi intervalli.

Scutello subrettangolare, piano, ribordato alla base, punteggiato. Elitre 2,9 volte più lunghe del pronoto e 2,7 volte più lunghe che larghe; lati paralleli fino alla metà, poi ristretti fino all'apice, questo troncato od appena incavato; strie punteggiate; interstrie piane con finissima punteggiatura.

Ultimo segmento addominale regolarmente arrotondato.

Apofisi prosternale regolarmente piegata dietro le anche, appena incisa all'apice.

Edeago come in fig. 14.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 6,8-7,5; largh. mm 1,7-1,9.

***Priopus philippinus* n. sp.**

Diagnosi. Per la colorazione simile a *nigripes* (Fleutiaux) ma distinto per le dimensioni minori, le antenne più corte e la punteggiatura del pronoto più densa.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Filippine: N Luzon, Zambales Prov., Zambales Mts., High Peak W side, m 350-1350, 18.III.2000, leg. L. Dembicky (CCW).

Descrizione del maschio. Bicolore; interamente rosso scuro ad eccezione delle elitre nerastre con sfumature ferruginee lungo la sutura; rivestito di ruvida e poco densa pubescenza fulva.

Fronte convessa con margine anteriore leggermente ispessito, regolarmente arcuato ed appena sporgente sul clipeo; punti profondi, da semplici a vagamente ombelicati con brevissimi intervalli. Antenne superanti con un segmento gli angoli posteriori del pronoto; articoli II e III subcilindrici e subeguali, presi assieme più corti del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi; XI lungamente ellissoidale.

Pronoto lungo quanto largo, moderatamente e regolarmente convesso con accenno di depressione mediana longitudinale nella declività basale; lati dalla base all'apice quasi regolarmente ristretti; angoli posteriori acuti, all'estremità apicale non divergenti, bicarenati; carene di eguale lunghezza, quella esterna poco più prominente; punti sul disco semplici o leggermente ombelicati, con intervalli pari in media al loro diametro, verso i lati più densi ed ai margini chiaramente ombelicati e pressoché contigui.

Scutello subrettangolare, leggermente sinuato ai lati, piano e punteggiato. Elitre 3 volte più lunghe del pronoto e 2,8 volte più lunghe che larghe; lati appena ma regolarmente ristretti dalla base all'apice, questo arrotondato ma con margini leggermente crenulati; strie regolarmente incise e punteggiate; interstrie piane con ruvida punteggiatura.

Ultimo segmento addominale leggermente incavato ai lati.

Apofisi prosternale regolarmente e immediatamente inclinata dietro le anche con apice integro.

Edeago con parameri dentati.

Femmina ignota.

Dimensioni. Lungh. mm 10; largh. mm 2,35.

***Priopus politoides* n. sp.**

(Fig. 13)

Diagnosi. Specie molto simile nell'aspetto generale a *politus* (Candèze) ma distinto per il corpo più convesso, le antenne più corte e la forma dell'edeago.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Filippine: Mindoro Occ., Amnay river valley, 25 km SE Santa Cruz, 17.IV.2000, leg. L. Dembicky (CCW); Paratypus ♀: stessi dati (CPG).

Descrizione del maschio. Interamente castano ferrugineo con densa pubescenza fulva.

Fronte convessa con margine anteriore leggermente ispessito, regolarmente arcuato ed appena sporgente sul clipeo; punti forti, ombelicati, con brevissimi intervalli leggermente zigrinati. Antenne superanti con un segmento l'apice degli angoli posteriori del pronoto; articoli II e III subcilindrici, subeguali, presi assieme della lunghezza del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi, longitudinalmente carenati; XI lungamente ellissoidale.

Pronoto appena più largo che lungo, moderatamente e regolarmente convesso, con leggera depressione mediana longitudinale solo nella declività basale; lati leggermente arcuati, appena sinuati presso gli angoli posteriori, questi acuti, appena divergenti, bicarenati; le carene sono egualmente sviluppate e allo stesso livello e formano una lunga e stretta V diretta internamente; punti sul disco profondi, semplici o vagamente ombelicati con brevissimi intervalli lucidi, verso i lati più densi, più chiaramente ombelicati fino a contigui o con brevissimi intervalli zigrinati ai margini.

Scutello subrettangolare, leggermente convesso, ruvidamente punteggiato e ribordato alla base. Elitre 2,7 volte più lunghe del pronoto e 2,4 volte più lunghe che larghe; lati dalla base all'apice appena ma regolarmente ristretti; apice leggermente spinoso e subtroncato; strie regolari e punteggiate; interstrie piane con punti più sparsi.

Ultimo segmento addominale appena inciso ai lati.

Apofisi prosternale leggermente ma regolarmente piegata dietro le anche integra all'apice.

Edeago come in fig. 13.

Femmina. Corpo più parallelo e convesso; antenne più corte non raggiungenti l'apice degli angoli posteriori del pronoto con articoli II e III presi assieme più lunghi del IV.

Dimensioni. Lungh. mm 8,8-9; largh. mm 2,3-2,5.

***Priopus schultzei* n. sp.**

(Fig. 16)


Diagnosi. Simile per la colorazione a *nigripes* (Fleutiaux) ma più grande e larga con antenne più corte e punteggiatura del pronoto più densa.

Materiale esaminato. Holotypus ♂: Filippine: N Luzon, Ilocos Norte Prov., Patapat Mts, N of Adams, m 300, 3.IV.2000, leg. L. Dembicky (CCW); 5 Paratypi (2 ♂♂ e 3 ♀♀): stessi dati (CCW; CPG; MSNG).

Descrizione del maschio. Colorazione variabile; da quasi unicolore nerastro con capo e pronoto leggermente più scuri a bicolore col pronoto rosso scuro anche se con sfumature brune; antenne e zampe sempre ferruginei; rivestito di densa pubescenza giallo fulva.

Fronte piana o leggermente convessa con margine anteriore regolarmente arcuato, lievemente ispessito ed appena sporgente sul clipeo, questo leggermente bicarenato ai lati; punti profondi, ombelicati, con brevissimi intervalli lucidi. Antenne superanti con 1-1,5 articoli l'apice degli angoli posteriori del pronoto; articoli II e III subcilindrici, col III appena più lungo del II, presi assieme della lunghezza od appena più corti del IV; IV-X triangolari, più lunghi che larghi, longitudinalmente carenati; XI lungamente ellissoidale.

Pronoto lungo quanto largo od appena più largo, fortemente convesso con accenno di depressione mediana longitudinale nella metà posteriore; lati appena arcuati, dalla base all'apice quasi regolarmente ristretti; angoli posteriori acuti, divergenti, bicarenati; le carene hanno eguale sviluppo e decorrono subparallele verso l'interno; punti sul disco profondi, semplici o vagamente ombelicati, con intervalli variabili, in media pari al loro diametro, verso i lati più densi e perfino contigui e ombelicati; ribordo laterale completo.



Figg. 15-20 - Edeago in visione dorsale. *Priopus fasciatus* n. sp. (15); *P. schultzei* n. sp. (16). Habitus. *Priopus steinkeae* n. sp. ♂ (17); *P. beauchenei* n. sp. ♂ (18); *P. dissimilis* n. sp. ♂ (19); *P. horaki* n. sp. ♂ (20).

Scutello subrettangolare, leggermente sinuato ai lati, debolmente convesso e punteggiato. Elitre 2,7 volte più lunghe del pronoto e 2,7 volte più lunghe che larghe; lati dalla base all'apice regolarmente ristretti; margine apicale arrotondato e leggermente crenulato; strie ben evidenti e punteggiate; interstrie piane con punti più fini.

Ultimo segmento addominale leggermente incavato ai lati.

Apofisi prosternale orizzontale fino alla metà poi inclinata fino all'apice integro.

Edeago come in fig. 16.

Femmina. Più larga e convessa con antenne più corte non raggiungenti l'apice degli angoli posteriori del pronoto.

Dimensioni. Lungh. mm 16-17,2; largh. mm 3,8-4,2.

NUOVI DATI GEONEMICI E OSSERVAZIONI VARIE

Priopus bimaculatus (Fleutiaux, 1918)

Materiale esaminato. 2 ♂♂: India: Meghalaya, 3 km E Tura, m 1150, 18.IV.1999, leg. Dembicky & Pacholatko; Laos, 15 km NW Louang Namtha, 13/24. V.1997, leg. E. Jendek & O. Sausa (CCW; CSB).

Nuovo per l'India e il Laos.

Priopus brancuccii Platia & Schimmel, 1995

Materiale esaminato. 6 ♂♂: Malaysia: Perak, 25 km NE of Ipoh, Banjaran, m 1200, 1/13.V.2000, leg. P. Cechovsky (CPG).

Nuovo per la Malaysia.

Priopus brevicollis (Fleutiaux, 1940)

(Fig. 6)

Materiale esaminato. 1 ♂: Tailandia: Namuang, 21/26.V. 1993, leg. Pacholatko & Dembicky (CCW).

La specie era nota solo sulla base dell'Holotypus ♀.

Descrizione del maschio. Simile alla femmina ma con antenne più lunghe superanti con un articolo l'apice degli angoli

posteriori del pronoto, il quale è più trapezoidale.

Lungh. mm 7,8; largh. mm 2,4.

Edeago come in fig. 6.

Nuovo per la Tailandia.

Priopus brevis (Candèze, 1897)

Materiale esaminato. 8 ♂♂: Laos: 15 km NW Louang Namtha, 13/24.V.1997, leg. E. Jendek & O. Sausa; NE Laos, Hua Phan Prov., 25 km SE Vieng Xai, Ban Kangpabong env., 14/18.V.2001, leg. D. Hauck (CPG; CRG; CSB).

Nuovo per il Laos.

Priopus bryanti Platia & Schimmel, 1995

(Fig. 12)

Materiale esaminato. 4 ♂♂: Malaysia: Sabah, Crocker Range, Gunung Emas, m 500-1900, 6/21.V.1995, leg. I. Jenis (CCW; CPG).

Descrizione del maschio, sconosciuto al momento della descrizione della femmina. Identica colorazione, più piccolo e stretto con antenne più lunghe superanti con un articolo gli angoli posteriori del pronoto, che è subtrapezoidale.

Dimensioni. Lungh. mm 6,7-7.2; largh. mm 1,8-2.

Edeago come in fig. 12.

Priopus diversus (Fleutiaux, 1933)

Materiale esaminato. 2 ♂♂: Indonesia: Sumatra, Bandar Baru, V.1998 (CCW).

Nuovo per l'Indonesia.

Priopus flavidus Platia & Schimmel, 1995

Materiale esaminato. 1 ♂: Indonesia: Sumatra, Utara, 30 km W Pemangtan Siantar, 3.III.1997, leg. E. Diehl (CCW).

La specie era nota in un solo esemplare.

Dimensioni. Lungh. mm 9,8; largh. mm 2,5.

Priopus merkli Platia & Schimmel, 1996

Materiale esaminato. 1 ♀: Filippine: Marinduque, VIII. 1996, leg. Lavron (CRG).

Nuovo per l'isola.

Priopus minidiversus Platia & Schimmel, 1996

Materiale esaminato. 4 exx.: India: W Bengal, Darjeeling, Kurseong, Chiple Forest, m 1000, 9.VI.1987, leg. N. Dangal; Assam, 5 km N of Umrongso, m 700, 17/25.V.1999, leg. Z. Kostal (CHKM; CPG).

Nuovo per l'India.

Priopus nigerrimus (Fleutiaux, 1903)

Materiale esaminato. 3 ♂♂: Laos: Bolikhamsai prov., Ban Nape-Kaew Nua Pass, 18.IV-1.V.1998, leg. E. Jendek & O. Sausa; NE Laos, Hua Phan Prov., Phu Loei N.P., Ban Sakok, 23/26.V.2001, leg. D. Hauck (CRG; CSB).

Nuovo per il Laos.

Priopus ornatus (Candèze, 1891)

Materiale esaminato. 16 ♂♂ e ♀♀: Laos: Nam Lang, IV.1918, leg. Vitalis de Salvaza; 15-20 km NW Louang Namtha, 5/24.V.1997, leg. E. Jendek, O. Sausa, M. Strba & R. Hergovits; Khammouan prov., Nakai env., route n. 8, m 560, 4/8.V.1998, leg. E. Jendek & O. Sausa; Bolikhamsai prov., Ban Nape-Kaew Nua Pass, m 600, 18.IV-1.V.1998, leg. M. Strba & R. Hergovits (IRSNB; CPG; CSB).

Nuovo per il Laos.

Priopus pendleburyi Platia & Schimmel, 1995

Materiale esaminato. 2 ♀♀: Birmania, Tenasserim, 29.IV.1995, leg. S. Steinke (CCW; CPG).

Nuovo per la Birmania.

Priopus rufulus (Candèze, 1891)

Materiale esaminato. 1 ♂: Malaysia: Perak, road Tapah-Ringlet, 10 km S Ringlet, m 800, 14/19.IV.1999, A. Ballerio (CCW).

Nuovo per la Malaysia.

Priopus rugosus (Fleutiaux, 1918)

Materiale esaminato. 2 ♂♂: China: Sichuan, Emei Shan, VI.1992; Tatsienlou, Yuling S. (CPG; coll. Jagemann, MMB).

Nuovo per la Cina.

Priopus spiloderus (Candèze, 1865)

Materiale esaminato. 4 exx.: S Thailand: Betong, Gunung Cang dun vill., Yala distr., 25.III-22.IV.1993, leg. J. Strnad; Burma, Tenasserim, 30.III.1994, leg. S. Steinke (CPG, CCW).

Nuovo per la Tailandia e la Birmania.

Priopus vitalisi (Fleutiaux, 1933)

Materiale esaminato. 15 ♂♂ e ♀♀: Laos: 20 km NW Louang Namtha, 5/11.V.1997, leg. M. Strba & R. Hergovits (CPG; CSB).

Nuovo per il Laos.

NUOVE SINONIMIE

Neodiploconus dirangensis Punam & Vasu, 1996 (Arunachal Pradesh) = *Priopus dureli* Platia & Schimmel, 1995 (Bhutan; Sikkim) (**n. syn.**).

Neodiploconus neeraae Punam & Vasu, 1996 (Uttar Pradesh) = *Priopus trimaculatus* (Hope, 1831) (Nepal; Bhutan; Sikkim) (**n. syn.**).

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano sentitamente tutti coloro che in vario modo hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro e in particolare: Dr. R. Poggi (MCSN); Dr. O. Merkl (TM); Dr. P. Cate, Wien; S. Riese, Genova; J. Horak, Praga; E. Jendek e O. Sausa, Bratislava; J. Mertlik, Hradec Kralove.

BIBLIOGRAFIA

- PLATIA G. & SCHIMMEL R., 1995a - Revision of *Priopus* species from Malaysia, Indonesia, New Guinea and Pacific Islands (Coleoptera, Elateridae, Melanotinae) - *Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., Entom.*, Bruxelles, 65: 135-173.
- PLATIA G. & SCHIMMEL R., 1995b - I *Priopus* della regione indiana (Coleoptera Elateridae, Melanotinae) - *Lav. Soc. ven. Sc. nat.*, Venezia, 20: 53-65.
- PLATIA G. & SCHIMMEL R., 1996a - I *Priopus* Castelnau di Birmania, Thailandia, Laos, Cambodia, Vietnam, China (Coleoptera, Elateridae, Melanotinae) - *Annali Mus. civ. St. nat. "G. Doria"*, Genova, 91: 179-225.
- PLATIA G. & SCHIMMEL R., 1996b - Review of the genus *Priopus* Castelnau (Coleoptera, Elateridae, Melanotinae) from the Philippine Islands - *Micronesica*, Guam, 28(2): 153-191.
- PUNAM G. & VASU V., 1996 - Two new species and a revised key to genus *Neodiploconus* Hyslop (Coleoptera, Elateridae: Melanotinae) from India - *Journ. Bombay nat. Hist. Soc.*, 93(2): 260-262.

RIASSUNTO

Nel lavoro vengono descritte 19 nuove specie di *Priopus* Castelnau dalla Regione Indiana alle Filippine (per la prima volta vengono riportate due specie per l'Isola di Mindoro). Per 16 specie vengono pubblicati nuovi dati geonemici e per due di esse viene anche brevemente descritto il maschio, prima sconosciuto, con la raffigurazione dell'edeago. Infine vengono proposte due sinonimie per due specie recentemente descritte dell'India.

ABSTRACT

Description of new *Priopus* Castelnau with geonemic and synonymic notes (Coleoptera, Elateridae, Melanotinae).

Priopus bispinosus n. sp. (India): separated by all other species for the presence of two short spines directed ventrally in the anterior margin of frons.

Priopus beauchenei n. sp. (S Vietnam): allied to *rufulus* (Candèze) but separated for the slimmer body, longer antennae and the posterior angles of pronotum acuminate and divergent at apex.

Priopus decoratus n. sp. (Thailand): allied to *brevis* (Candèze) for the bicoloured

teguments and shape of prosternal process but separated by the smaller body and the longer antennae.

Priopus dissimilis n. sp. (S Vietnam): allied to *angulatus* (Candèze) but separated essentially for the longer antennae exceeding by two articles the apices of posterior angles of pronotum.

Priopus kirschi n. sp. (Laos): allied to *quatei* Platia & Schimmel for the impressed frons near the anterior margin of pronotum but separated for the dark colour and longer antennae exceeding the hind angles of pronotum.

Priopus laoticus n. sp. (Laos): allied to *steinkeae* n. sp. but separated by the subquadrate pronotum less arcuate at sides and with the carinae of posterior angles equally developed.

Priopus steinkeae n. sp. (Burma): allied to *laoticus* n. sp. but separated for the wider pronotum and the inner carina of posterior angles of pronotum feeble and at lower level than outer.

Priopus baumi n. sp. (Singapore; W Malaysia) allied to *exquisitus* (Candèze) but with smaller body, uniform colour, longer antennae from fourth article with slight and longitudinal carina.

Priopus everetti n. sp. (Indonesia: Sulawesi): allied to *ineptus* (Candèze) but separated by the larger body and short apex of posterior angles of pronotum.

Priopus horaki n. sp. (Malaysia: Sarawak): allied to *candezai* Platia & Schimmel for the general outline and size, separated essentially by the inner carina of the posterior angles of pronotum very feeble and at lower level than outer.

Priopus humeralis n. sp. (Indonesia: Sumatra): bicolored species allied to *basalis* (Schwarz) but separated for the smaller body, only elytral humera yellow-orange and first two intervals and elytral suture black.

Priopus jucundus n. sp. (W Malaysia): species with unicarinate posterior angles of pronotum; bicolored as *seminiger* (Candèze) but separated by smaller size and head blackish as elytra.

Priopus pahangensis n. sp. (W Malaysia): allied to *exquisitus* (Candèze) for the general shape but separated essentially for the shorter antennae not reaching the apices of posterior angles of pronotum.

Priopus seramensis n. sp. (Indonesia: Seram Is.): allied to *bicolor* Platia & Schimmel from Philippines for the general shape and colour but separated by the elytral apex clearly emarginate.

Priopus sumatrensis n. sp. (Indonesia: Sumatra): allied to *flavidus* Platia & Schimmel but separated for the smaller body, darker colour and shorter antennae not reaching the apices of posterior angles of pronotum.

Priopus fasciatus n. sp. (Philippines: N Luzon): allied to *samuelsoni* Platia & Schimmel but essentially separated by the black head and coarser punctures of pronotum.

Priopus mindoroensis n. sp. (Philippines: Mindoro): allied to *torrevillasi* Platia & Schimmel but separated by the smaller size, lighter colour, second and third antennal articles together longer than fourth.

Priopus philippinus n. sp. (Philippines: N Luzon): bicoloured species allied to *nigripes* (Fleutiaux) but with smaller size, shorter antennae and denser punctures of pronotum.

Priopus politoides n. sp. (Philippines: Mindoro): allied to *politus* (Candèze) but

separated for the more convex body, shorter antennae and apex of male genitalia paramera.

Priopus schultzei n. sp. (Philippines : N Luzon): allied to *nigripes* (Fleutiaux) but separated by the larger body, shorter antennae and denser punctures of pronotum.

Neodiploconus dirangensis Punam & Vasu, 1996 (Arunachal Pradesh) = *Priopus dureli* Platia & Schimmel, 1995 (Bhutan; Sikkim) (**n. syn.**).

Neodiploconus neeraae Punam & Vasu, 1996 (Uttar Pradesh) = *Priopus trimaculatus* (Hope, 1831) (Nepal; Bhutan; Sikkim) (**n. syn.**).
